

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Метазид
таблетки 500 мг
АО «Фармасинтез», Россия

Регистрационный номер: Р N003048/01 от 06.10.2009

Торговое наименование: Метазид

Международное непатентованное наименование: метазид

Химическая формула: 1,1-метилтен-бис-(изоникотеноилгидразон)

Лекарственная форма: Таблетки

Состав

Действующее вещество: метазид 500 мг

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 7,5 мг, гидроксипропилцеллюлоза низкозамещенная – 21,7 мг, повидон (коллидон-25) – 15,8 мг, кальция стеарат – 5,0 мг.

Описание.

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской и риской.

Фармакотерапевтическая группа: Противотуберкулёзное средство

Код АТХ: J04AK

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Метазид - синтетическое противотуберкулёзное средство.

Метазид обладает высокой бактериостатической активностью в отношении к *Mycobacterium tuberculosis*. Подавляет рост и развитие микобактерий туберкулёза. Он особенно активен в отношении активно делящихся *Mycobacterium tuberculosis* (в том числе расположенных внутриклеточно). Нарушает синтез фосфолипидов мембран и образует хелатные комплексы с двухвалентными катионами металлов, что изменяет нормальную жизнедеятельность микроорганизма и синтез нуклеиновых кислот; останавливает размножение микобактерий туберкулёза. При монотерапии устойчивость развивается быстрее.

Фармакокинетика.

Метазид хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Приём во время еды снижает всасывание. Легко проникает через гематоэнцефалический барьер. После приёма внутрь максимальная концентрация в крови достигается через 1 час, а туберкулостатическая поддерживается в течении 24 часов. В печени ацетируется, выводится с желчью, ацетилированный метаболит не активен. Препарат выводится в основном почками в виде метаболитов и в неизменном виде.

Показания к применению

Все формы и локализации туберкулёза у взрослых и детей (в комбинации с другими противотуберкулёзными препаратами).

Противопоказания

- повышенная чувствительность к метазиду;
- беременность, лактация;
- стенокардия; декомпенсированные пороки сердца;
- органические заболевания ЦНС и периферических нервов, нарушение зрения, эпилепсия и приступы тонико-клонических судорог в анамнезе;
- заболевания почек нетуберкулёзного характера, а также с нарушением выделительной функции;
- печёночная недостаточность.

Способ применения и дозы

Внутрь, взрослым по 500 мг 2 раза в сутки. Высшая суточная доза для взрослых - 2 г. Детям из расчёта 20-30 мг/кг в 2-3 приёма. Высшая суточная доза для детей - 1 г.

Побочные действия

Головная боль, головокружение, тошнота, рвота, сухость во рту, болевые ощущения в области сердца и в эпигастрии, кожные аллергические реакции, возможны эйфория, ухудшение сна, в редких случаях - развитие психоза, расстройства памяти, периферического нерва и неврита зрительного нерва, нарушение координации движения, мышечные подергивания, лекарственного гепатита, у мужчин - гинекомастия, у женщин - меноррагии. У пациентов с эпилепсией возможно учащение судорожных припадков. Поражение печени и почек, атрофия зрительного нерва, агранулоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения, метгемоглобинемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Усиливает (взаимно) эффект других противотуберкулёзных препаратов.

Формы выпуска

Таблетки 500 мг.

Первичная упаковка лекарственного препарата.

По 10 таблеток, в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 100 таблеток в банку полимерную с крышечкой натягиваемой с контролем первого вскрытия. Свободное пространство заполняют ватой медицинской. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или из полимерных материалов, самоклеящиеся.

Вторичная упаковка лекарственного препарата.

По 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

По 1 банке вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона для потребительской тары.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

5 лет. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель

АО «Фармасинтез», Россия.

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 3.

Адрес производственной площадки:

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

Претензии потребителей направлять по адресу:

АО "Фармасинтез", Россия, 664040

г. Иркутск, ул. Р. Люксембург, д. 184.

тел.: 8-800-100-1550

www.pharmasyntez.com